

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

平成17年7月  
日本ヘキサル株式会社  
山形県上山市新金谷827-7  
株式会社陽進堂  
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

持続性<sub>1</sub>プロロッカー・血圧降下剤

指定医薬品 処方せん医薬品

メシル酸ドキサゾシン錠 Y D 1 mg

メシル酸ドキサゾシン錠 Y D 2 mg

メシル酸ドキサゾシン錠

## 使用上の注意改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、自主改訂により、弊社製品『メシル酸ドキサゾシン錠 Y D 1 mg・2mg』の使用上の注意事項を改訂致しましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。つきましては、今後本剤をご使用されます際には、この使用上の注意に十分ご留意頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬白

### 【改訂内容】（下線部改訂部分）

改訂後			改訂前		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
利尿剤又は他の降圧剤	相互に作用を増強するおそれがあるので、減量するなど注意すること。	相互に作用を増強するおそれがある。	利尿剤又は他の降圧剤	相互に作用を増強するおそれがあるので、減量するなど注意すること。	相互に作用を増強するおそれがある。
クエン酸シルデナフィル	本剤との併用でめまい等の自覚症状を伴う血圧低下を来したとの報告がある。	クエン酸シルデナフィルは血管拡張作用による降圧作用を有するため、本剤の降圧作用を増強する <u>こと</u> がある。	クエン酸シルデナフィル	本剤との併用で服用後4時間以内にめまい等の自覚症状を伴う血圧低下を来したとの報告がある。	クエン酸シルデナフィルは血管拡張作用による降圧作用を有するため、本剤の降圧作用を増強するおそれがある。
相互作用 (1) 併用禁忌：現行のとおり  (2) 併用注意（併用に注意すること）			相互作用 (1) 併用禁忌：現行のとおり  (2) 併用注意（併用に注意すること）		

### 【改訂理由】

企業報告に基づき、注意喚起を行うものです。

なお、改訂内容につきましては、日薬連発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報（DSU）141」（2005年8月）に掲載されます。