

使用上の注意改訂のお知らせ

平成22年7月

サンド株式会社

山形県上市市新金谷827-7

処方せん医薬品（注意-医師等の処方せんにより使用すること）

マクロライド系抗生物質製剤

クラリスロマイシン錠200mg「サンド」

Clarithromycin Tablets 200mg [SANDOZ]

日本薬局方 クラリスロマイシン錠

このたび、標記製品の使用上の注意事項を改訂いたしましたので、お知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、新しい使用上の注意をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容（下線部 _____：改訂・追記箇所、 ：削除箇所）】

改訂後			改訂前																										
<p>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</p> <p>(1)変更無し</p> <p>(2)ピモジド、エルゴタミン含有製剤、<u>タダラフィル</u>（<u>アドシルカ</u>）を投与中の患者（「3.相互作用」の項参照）</p>			<p>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</p> <p>(1)省略</p> <p>(2)ピモジド、エルゴタミン含有製剤を投与中の患者（「3.相互作用」の項参照）</p>																										
<p>【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用</p> <p>(1)併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ピモジド オーラップ</td> <td>QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。</td> <td>本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 クリアミン ジヒデルゴット</td> <td>血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>タダラフィル</u> <u>アドシルカ</u></td> <td><u>左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ピモジド オーラップ	QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。	エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 クリアミン ジヒデルゴット	血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。		<u>タダラフィル</u> <u>アドシルカ</u>	<u>左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。</u>		<p>【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用</p> <p>(1)併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ピモジド オーラップ</td> <td>QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。</td> <td>本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 カフェルゴット クリアミン ジヒデルゴット</td> <td>血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	ピモジド オーラップ	QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。	エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 カフェルゴット クリアミン ジヒデルゴット	血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。				
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																											
ピモジド オーラップ	QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。																											
エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 クリアミン ジヒデルゴット	血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。																												
<u>タダラフィル</u> <u>アドシルカ</u>	<u>左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。</u>																												
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																											
ピモジド オーラップ	QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。																											
エルゴタミン（エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 カフェルゴット クリアミン ジヒデルゴット	血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。																												
<p>(2)併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 <u>タダラフィル</u> <u>シアリス</u> 等</td> <td>左記薬剤の作用が増強される可能性がある。</td> <td>本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	(省略)			ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 <u>タダラフィル</u> <u>シアリス</u> 等	左記薬剤の作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。	(省略)			<p>(2)併用注意（併用に注意すること）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> <tr> <td>ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 等</td> <td>左記薬剤の作用が増強される可能性がある。</td> <td>本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">(省略)</td> </tr> </tbody> </table>			薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	(省略)			ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 等	左記薬剤の作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。	(省略)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																											
(省略)																													
ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 <u>タダラフィル</u> <u>シアリス</u> 等	左記薬剤の作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。																											
(省略)																													
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																											
(省略)																													
ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィル クエン酸塩 等	左記薬剤の作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。																											
(省略)																													

改 訂 後 (下線部___ : 改訂・追記箇所)	改 訂 前																																				
<p>4. 副作用 (2) その他の副作用 下記のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて、適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 類</th> <th style="text-align: center;">頻度不明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>過 敏 症</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td>不眠、幻覚^{注)}、失見当識^{注)}、意識障害^{注)}、せん妄^{注)}、躁病^{注)}、眠気</td> </tr> <tr> <td>感 覚 器</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>消 化 器</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>血 液</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>中枢神経系</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>肝 臓</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症^{注)}、動悸^{注)}、発熱、筋痛^{注)}、CK (CPK) 上昇^{注)}、脱毛、頻尿</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) あらわれた場合には投与を中止すること。</p>	種 類	頻度不明	過 敏 症	省略	精神神経系	不眠、幻覚 ^{注)} 、失見当識 ^{注)} 、意識障害 ^{注)} 、せん妄 ^{注)} 、躁病 ^{注)} 、眠気	感 覚 器	省略	消 化 器	省略	血 液	省略	中枢神経系	省略	肝 臓	省略	そ の 他	倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症 ^{注)} 、動悸 ^{注)} 、発熱、筋痛 ^{注)} 、CK (CPK) 上昇 ^{注)} 、脱毛、頻尿	<p>4. 副作用 (2) その他の副作用 下記のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて、適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種 類</th> <th style="text-align: center;">頻度不明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>過 敏 症</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td>不眠、幻覚^{注)}、失見当識^{注)}、意識障害^{注)}、せん妄^{注)}、躁病^{注)}</td> </tr> <tr> <td>感 覚 器</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>消 化 器</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>血 液</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>中枢神経系</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>肝 臓</td> <td style="text-align: center;">省略</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症^{注)}、動悸^{注)}、発熱、筋痛^{注)}、CK (CPK) 上昇^{注)}</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) あらわれた場合には投与を中止すること。</p>	種 類	頻度不明	過 敏 症	省略	精神神経系	不眠、幻覚 ^{注)} 、失見当識 ^{注)} 、意識障害 ^{注)} 、せん妄 ^{注)} 、躁病 ^{注)}	感 覚 器	省略	消 化 器	省略	血 液	省略	中枢神経系	省略	肝 臓	省略	そ の 他	倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症 ^{注)} 、動悸 ^{注)} 、発熱、筋痛 ^{注)} 、CK (CPK) 上昇 ^{注)}
種 類	頻度不明																																				
過 敏 症	省略																																				
精神神経系	不眠、幻覚 ^{注)} 、失見当識 ^{注)} 、意識障害 ^{注)} 、せん妄 ^{注)} 、躁病 ^{注)} 、眠気																																				
感 覚 器	省略																																				
消 化 器	省略																																				
血 液	省略																																				
中枢神経系	省略																																				
肝 臓	省略																																				
そ の 他	倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症 ^{注)} 、動悸 ^{注)} 、発熱、筋痛 ^{注)} 、CK (CPK) 上昇 ^{注)} 、脱毛、頻尿																																				
種 類	頻度不明																																				
過 敏 症	省略																																				
精神神経系	不眠、幻覚 ^{注)} 、失見当識 ^{注)} 、意識障害 ^{注)} 、せん妄 ^{注)} 、躁病 ^{注)}																																				
感 覚 器	省略																																				
消 化 器	省略																																				
血 液	省略																																				
中枢神経系	省略																																				
肝 臓	省略																																				
そ の 他	倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症 ^{注)} 、動悸 ^{注)} 、発熱、筋痛 ^{注)} 、CK (CPK) 上昇 ^{注)}																																				

【改訂理由(自主改訂)】

1. 「禁忌」および「3.相互作用」の「(1)併用禁忌」の項の「アドシルカ」の追記

ホスホジエステラーゼ5阻害剤であるタダラフィル製剤として、新たにアドシルカ（タダラフィル）が肺動脈性肺高血圧症の効能で発売されました。本剤の肝薬物代謝酵素（CYP3A4）阻害作用により、アドシルカの代謝が阻害され、アドシルカの血中濃度が上昇する可能性があるため、追記いたしました。[詳細は、アドシルカ錠（タダラフィル）の添付文書をご参照ください]

「(2)併用注意」の項でのタダラフィル製剤の薬剤名（シアリス）の追記

タダラフィル製剤として併用注意に記載される対象を限定するために、薬剤名（シアリス、勃起不全治療剤）を記載いたしました。

2. 「3.相互作用」の「(1)併用禁忌」の項の「カフェルゴット」の削除

カフェルゴット錠の販売中止により、削除いたしました。

3. 「4.副作用」の「(2)その他の副作用」の項の改訂

国内外におけるクラリスロマイシン製剤の情報を受け、改訂いたしました。

改訂後の「使用上の注意」全文も併せてご参照ください。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU) No. 191 (2010年7月)」に掲載されます。

クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 使用上の注意（全文）

(⇒2010年7月改訂第5版)

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

- (1)本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- (2)ピモジド、エルゴタミン含有製剤、タダラフィル（アドシルカ）を投与中の患者（「3.相互作用」の項参照）

〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉

- (1)本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。
- (2)本剤は、免疫不全等合併症を有さない軽症ないし中等症のレジオネラ肺炎に対し、1日400mg分2投与することにより、通常2～5日で症状は改善に向う。症状が軽快しても投与は2～3週間継続することが望ましい。また、レジオネラ肺炎は再発の頻度が高い感染症であるため、特に免疫低下の状態にある患者等では、治療終了後、さらに2～3週間投与を継続し症状を観察する必要がある。なお、投与期間中に症状が悪化した場合には、速やかにレジオネラに有効な注射剤（キノロン系薬剤等）への変更が必要である。
- (3)クラミジア感染症に対する本剤の投与期間は原則として14日間とし、必要に応じてさらに投与期間を延長する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- (2)肝機能障害のある患者〔肝機能障害を悪化させることがある。（「4.副作用」の項参照）〕
- (3)腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。（「3.相互作用」の項参照）〕
- (4)心疾患のある患者〔QT延長、心室頻拍（Torsades de pointesを含む）、心室細動を起こすことがある。（「4.副作用」の項参照）〕
- (5)高齢者（「5.高齢者への投与」の項参照）

2. 重要な基本的注意

本剤を胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症に用いる際には、アモキシシリン水和物及びプロトンポンプインヒビター（ランソプラゾール又はオメプラゾール）の添付文書に記載されている禁忌、慎重投与、重大な副作用等の使用上の注意を必ず確認すること。

3. 相互作用

本剤は、肝代謝酵素チトクロームP450（CYP）3A4阻害作用を有することから、CYP3A4で代謝される薬剤と併用したとき、併用薬剤の代謝が阻害され血中濃度が上昇する可能性がある。一方、本剤はCYP3A4によって代謝されることから、CYP3A4を阻害する薬剤と併用したとき、本剤の代謝が阻害され未変化体の血中濃度が上昇する可能性があり、また、CYP3A4を誘導する薬剤と併用したとき、本剤の代謝が促進され未変化体の血中濃度が低下する可能性がある。

(1)併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ピモジド オーラップ	QT延長、心室性不整脈（Torsades de pointesを含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
エルゴタミン （エルゴタミン酒石酸塩、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩）含有製剤 クリアミン ジヒデルゴット	血管攣縮等の重篤な副作用を起こすおそれがある。	
タダラフィル アドシルカ	左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。	

(2)併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジゴキシン	嘔気、嘔吐、不整脈等が報告されているので、ジゴキシンの血中濃度の推移、自覚症状、心電図等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤の腸内細菌叢に対する影響により、ジゴキシンの不活化が抑制されるか、もしくはP-糖蛋白質を介したジゴキシンの輸送が阻害されることにより、その血中濃度が上昇する。
テオフィリン アミノフィリン 水和物 コリンテオフィリン	テオフィリン中毒症状（痙攣、横紋筋融解症等）が報告されているので、テオフィリンの血中濃度の推移等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、テオフィリンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
ジソピラミド	QT延長、低血糖等が報告されているので、心電図、自覚症状等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、ジソピラミドの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
カルバマゼピン	嗜眠、眩暈、眼振、運動失調等が報告されているので、カルバマゼピンの血中濃度の推移、自覚症状等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、カルバマゼピンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
シクロスポリン	腎障害等が報告されているので、シクロスポリンの血中濃度の推移、腎機能検査値等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シクロスポリンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
タクロリムス水和物	クレアチニン上昇等が報告されているので、タクロリムスの血中濃度の推移、腎機能検査値等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用によりタクロリムスの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリンカリウム等	プロトロンビン時間延長等が報告されているので、血液凝固能検査値等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
ベンゾジアゼピン系薬剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) トリアゾラム ミダゾラム等	傾眠等の中枢神経系抑制作用の増強が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
エレトリプタン 臭化水素酸塩	エレトリプタンの作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、エレトリプタンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する可能性がある。
カルシウム拮抗剤 (CYP3A4で代謝される薬剤) ニフェジピン ベラパミル塩酸塩等	血圧低下 (ふらつき、脱力感、嘔気)、頻脈、徐脈等が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
エプレレノン	エプレレノンの作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、エプレレノンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
イトラコナゾール	イトラコナゾールの作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、イトラコナゾールの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
シンバスタチン アトルバスタチン カルシウム水和物 ロバスタチン (国内未承認)	筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすいので、筋肉痛、脱力感等の症状及びCK (CPK) 上昇、血中・尿中ミオグロビン上昇等の検査値異常に十分注意し、異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。 腎機能障害のある患者には特に注意すること。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
スルホニル尿素系血糖降下剤 グリベンクラミド等	低血糖 (意識障害に至ることがある) が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止し、ブドウ糖の投与等の適切な処置を行うこと。	機序は明確ではないが、本剤との併用により、左記薬剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
コルヒチン	コルヒチン中毒症状 (汎血球減少、肝機能障害、筋痛、腹痛、嘔吐、下痢、発熱等) が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、コルヒチンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する可能性がある。
ジエノゲスト	ジエノゲストの作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、ジエノゲストの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。
ホスホジエステラーゼ5阻害剤 シルденаフィルクエン酸塩 タダラフィル シアリス等	左記薬剤の作用が増強される可能性がある。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、シルденаフィルの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇することが報告されている。
HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル サキナビルメシル酸塩等	本剤の未変化体の血中濃度が上昇する可能性がある。 また、サキナビルとの併用において、サキナビルの血中濃度が上昇し、本剤の活性代謝物の血中濃度が低下することが報告されている。	本剤と左記薬剤のCYP3A4に対する阻害作用により、相互に代謝が阻害される。
デラビルジンメシル酸塩	デラビルジンの未変化体の血中濃度が上昇することが報告されている。 また、本剤の未変化体の血中濃度が上昇し、活性代謝物の血中濃度が低下することが報告されている。	本剤とデラビルジンのCYP3A4に対する阻害作用により、相互に代謝が阻害される。
エファピレンツネビラピン	本剤の未変化体の血中濃度が低下し、活性代謝物の血中濃度が上昇することが報告されている。	左記薬剤のCYP3A4に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
リファンピシン	本剤の作用が減弱する可能性があるため、その場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	リファンピシンのCYP3A4に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進され、本剤の未変化体の血中濃度が約1/8に低下するとの報告がある。
リファブチン	ぶどう膜炎等が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。	本剤のCYP3A4に対する阻害作用により、リファブチンの代謝が阻害され、その血中濃度が上昇する。

⇒4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用 (頻度不明)

- 1) ショック、アナフィラキシー様症状：ショック、アナフィラキシー様症状(呼吸困難、痙攣、発赤等)を起こすことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) QT延長、心室頻拍 (Torsades de pointesを含む)、心室細動：QT延長、心室頻拍 (Torsades de pointesを含む)、心室細動があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、QT延長等の心疾患のある患者には特に注意すること (「1. 慎重投与」の項参照)。
- 3) 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全：劇症肝炎、AST (GOT)、ALT (GPT)、 γ -GTP、LDH、Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 4) 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症：血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 5) 皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症 (Lyell症候群)：皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死症 (Lyell症候群) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 6) PIE症候群・間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常、好酸球増多等を伴うPIE症候群・間質性肺炎があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 7) 偽膜性大腸炎、出血性大腸炎：偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 8) 横紋筋融解症：筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うとともに、横紋筋融解症による急性腎不全の発症に注意すること。
- 9) 痙攣：痙攣 (強直間代性、ミオクロヌス、意識消失発作等) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

10) アレルギー性紫斑病：アレルギー性紫斑病があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11) 急性腎不全：急性腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、乏尿等の症状や血中クレアチニン値上昇等の腎機能低下所見が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

下記のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて、適切な処置を行うこと。

種類	頻度不明
過敏症	発疹 ^{注)} 、痒痒感
精神神経系	不眠、幻覚 ^{注)} 、失見当識 ^{注)} 、意識障害 ^{注)} 、せん妄 ^{注)} 、躁病 ^{注)} 、眠気
感覚器	味覚異常 (にがみ等)、耳鳴 ^{注)} 、聴力低下 ^{注)} 、嗅覚異常 ^{注)}
消化器	嘔気、嘔吐、胃部不快感、腹部膨満感、腹痛、下痢、食欲不振、軟便、口内炎、舌炎、舌変色、口腔内びらん ^{注)} 、胸やけ、口渇、歯牙変色 ^{注)}
血液	好酸球増多
中枢神経系	めまい、振戦 ^{注)} 、しびれ (感) ^{注)}
肝臓	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、 γ -GTP上昇、LDH上昇、Al-P上昇
その他	倦怠感、頭痛、浮腫、カンジダ症 ^{注)} 、動悸 ^{注)} 、発熱、筋痛 ^{注)} 、CK (CPK) 上昇 ^{注)} 、脱毛、頻尿

注) あらわれた場合には投与を中止すること。

(3) ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する除菌療法 (3剤併用) で認められた副作用

種類	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、痒痒
精神神経系	頭痛、しびれ感、めまい、眠気、不眠、うつ状態
消化器	下痢、軟便、味覚異常、腹痛、腹部膨満感、口内炎、便秘、食道炎、口渇、悪心、舌炎、胃食道逆流、胸やけ、十二指腸炎、嘔吐、痔核、食欲不振
血液 ^{注2)}	好中球減少、好酸球増多、貧血、白血球増多、血小板減少
肝臓 ^{注2)}	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、LDH上昇、 γ -GTP上昇、Al-P上昇、ビリルビン上昇
その他	尿蛋白陽性、トリグリセライド上昇、総コレステロール上昇・減少、尿糖陽性、尿酸上昇、倦怠感、熱感、動悸、発熱、QT延長、カンジダ症、浮腫、血圧上昇、霧視

注1) このような場合には投与を中止すること。

注2) 観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。

なお、アモキシシリン水和物及びランソプラゾールとの併用の場合において、外国で行われた試験で認められている副作用は次のとおりである。

種類	頻度不明
消化器	下痢、味覚異常、悪心、口内炎、舌炎
その他	頭痛、めまい、膣モニリア症

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では、生理機能が低下しており、高い血中濃度が持続するおそれがあるので、慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)動物実験で、母動物に毒性があらわれる高用量において、胎児毒性（心血管系の異常、口蓋裂、発育遅延等）が報告されているので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

なお、国外における試験で次のような報告がある。SD系ラット（15～150mg/kg/日）及びCD-1系マウス（15～1,000mg/kg/日）において、それぞれ母動物に毒性があらわれる最高用量でラット胎児に心血管系異常並びにマウス胎児に口蓋裂が認められた。また、サル（35～70mg/kg/日）において、母動物に毒性があらわれる70mg/kg/日で9例中1例に低体重の胎児がみられたが、外表、内臓、骨格には異常は認められなかった。

また、ラットにクラリスロマイシン（160mg/kg/日）、ランソプラゾール（50mg/kg/日）及びアモキシシリン水和物（500mg/kg/日）を併用投与した試験において、母動物での毒性の増強とともに胎児の発育抑制の増強が認められている。

(2)ヒト母乳中へ移行することが報告されているので、授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。

なお、動物実験（ラット）の乳汁中濃度は、血中濃度の約2.5倍で推移した。

7. 小児等への投与

低出生体重児及び新生児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

8. 適用上の注意

(1)レジオネラ肺炎の治療において単独で使うことが望ましいが、患者の症状に応じて併用が必要な場合には以下の報告を参考に併用する薬剤の特徴を考慮し選択すること。

1) 中等症以上の患者にリファンピシンと併用し有効との報告がある。

2) *in vitro* 抗菌力の検討において、本剤とレボフロキサシン又はシプロフロキサシンとの併用効果（相乗ないし相加作用）が認められたとの報告がある。

(2)投与時

健常人で天然ケイ酸アルミニウムと併用した場合、本剤の吸収が低下するとの報告がある。

(3)薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、さらには穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

9. その他の注意

(1)ラットにアモキシシリン水和物（2,000mg/kg/日）とランソプラゾール（15mg/kg/日以上）の4週間併用経口投与した試験、及びイヌにアモキシシリン水和物（500mg/kg/日）、ランソプラゾール（100mg/kg/日）、クラリスロマイシン（25mg/kg/日）の4週間併用経口投与した試験で、アモキシシリン水和物を単独あるいは併用投与した動物に結晶尿が認められているが、結晶はアモキシシリン水和物が排尿後に析出したものであり、体内で析出したものではないことが確認されている。

(2)ヘリコバクター・ピロリの除菌判定上の注意

ランソプラゾール等のプロトンポンプインヒビターやアモキシシリン水和物、クラリスロマイシン等の抗生物質の服用中や投与終了直後では、¹³C-尿素呼気試験の判定結果が偽陰性になる可能性があるため、¹³C-尿素呼気試験による除菌判定を行う場合には、これらの薬剤の投与終了後4週以降の時点で実施することが望ましい。

【資料請求先】

サンド株式会社

カスタマーケアグループ

〒106-0031 東京都港区西麻布4-16-13

フリーコール (0120)982-001

FAX (03)5469-0366