

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

平成19年12月

サンド株式会社
山形県上山市新金谷 827-7
株式会社 陽進堂
富山県富山市婦中萩島 3697 番地 8 号

持続性選択H₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

指定医薬品、処方せん医薬品

セチリジン塩酸塩錠 5mg「YD」 セチリジン塩酸塩錠 10mg「YD」 塩酸セチリジン錠

使用上の注意改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、自主改訂により、弊社製品『セチリジン塩酸塩錠 5mg・10mg「YD」』の使用上の注意事項を改訂致しましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。つきましては、今後本剤をご使用されます際には、この使用上の注意に十分ご留意頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

敬白

改訂内容（下線部改訂部分）

改訂後			改訂前
【使用上の注意】 3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			【使用上の注意】 ←新設
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	
ピルシカイニド塩酸塩水和物	併用により両剤の血中濃度が上昇し、ピルシカイニド塩酸塩水和物の副作用が発現したとの報告がある。	機序は明らかではない。	

【改訂理由】

相互作用の項を新設し、ピルシカイニド塩酸塩水和物との併用に対して、注意喚起を行うものです。

【参考文献】

Tsuruoka, S., et al. : Clin. Pharmacol. Ther., 79, 389-396 (2006)

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No.165」(2007年12月)に掲載されます。