

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

平成 26 年 11 月

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）  
持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

# ロラタジンOD錠 10mg「サンド」

ロラタジン口腔内崩壊錠

# サンド株式会社

山形県上山市新金谷827-7

このたび、標記製品の使用上の注意事項を改訂(自主改訂)いたしましたので、お知らせいたします。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容(下線部\_\_\_\_:改訂箇所、■:削除箇所)】

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>4.副作用 変更なし</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)ショック、アナフィラキシー:ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下、血管浮腫等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2)～4)変更なし</p> <p>(2)その他の副作用 変更なし</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>4.副作用 省略</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)ショック:ショックを起こすことがあるので、チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下等の症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>2)～4)省略</p> <p>(2)その他の副作用 省略</p>

### 【改訂理由】

ロラタジン製剤の情報に基づき改訂いたしました。

1. 「重大な副作用 1)ショック」の項へアナフィラキシー及び症状(血管浮腫)を追記いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU)No.235」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、サンドのホームページ「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)にてご覧になれます。

**【資料請求先】**

**サンド株式会社**

カスタマーケアグループ

〒106-0031 東京都港区西麻布 4-16-13

フリーコール (0120) 982-001

FAX (03) 5469-0366

受付時間 9:00~17:00

(土・日、祝日及び当社休日を除く)