

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

平成 27 年6 月

処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

抗血小板剤

# クロピドグレル錠 25mg「サンド」 クロピドグレル錠 75mg「サンド」

日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠

製造販売

**サンド株式会社**  
山形県上山市新金谷827-7

このたび、標記製品の使用上の注意事項を厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（薬食安通知）により改訂いたしましたので、お知らせいたします。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容(下線部\_\_\_\_\_：薬食安通知)】

改訂後	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)～6)変更なし</p> <p>7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形滲出性紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症:中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形滲出性紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>8)～10)変更なし</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>4. 副作用</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明)</p> <p>1)～6)省略</p> <p>7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形滲出性紅斑:中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形滲出性紅斑があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p> <p>8)～10)省略</p>

### 【改訂理由】

薬食安通知に基づき改訂いたしました。

「4. 副作用(1)重大な副作用」、「7)中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形滲出性紅斑」の項に「急性汎発性発疹性膿疱症」を追記いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU)No.239」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、サンドのホームページ「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)にてご覧になれます。

**【資料請求先】**

**サンド株式会社**

カスタマーケアグループ

〒105-6333 東京都港区虎ノ門 1-23-1

フリーコール (0120) 982-001

FAX (03) 6257-3633

受付時間 9:00~17:00

(土・日、祝日及び当社休日を除く)