

ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「サンド」 ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「サンド」

用法及び用量の一部変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「サンド」、ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「サンド」につきまして、「用法及び用量」の一部変更が2019年12月4日付にて承認されましたので、ご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品につきましてなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

●下線部 _____ : 変更箇所

変更後	変更前
<p>1. 膵癌、胆管癌、尿路上皮癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌、再発又は難治性の悪性リンパ腫の場合 通常、成人にはゲムシタビンとして 1 回 1000mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 3 週連続し、4 週目は休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。</p> <p>2. 非小細胞肺癌の場合 通常、成人にはゲムシタビンとして 1 回 1000mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 3 週連続し、4 週目は休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。<u>シスプラチンと併用する場合は、ゲムシタビンとして 1 回 1250mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 2 週連続し、3 週目は休薬を 1 コースとすることもできる。なお、患者の状態により適宜減量する。</u></p> <p>3. 手術不能又は再発乳癌の場合 通常、成人にはゲムシタビンとして 1 回 1250mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 2 週連続し、3 週目は休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>	<p>1. 非小細胞肺癌、膵癌、胆管癌、尿路上皮癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌、再発又は難治性の悪性リンパ腫の場合 通常、成人にはゲムシタビンとして 1 回 1000mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 3 週連続し、4 週目は休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。</p> <p>2. 手術不能又は再発乳癌の場合 通常、成人にはゲムシタビンとして 1 回 1250mg/m²を 30 分かけて点滴静注し、週 1 回投与を 2 週連続し、3 週目は休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。</p>

以上



サンド株式会社 カスタマーケアグループ



0120-982-001

受付時間 9:00~17:00

(土・日、祝日及び当社休日を除く)

URL <http://www.sandoz.jp>