

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

使用上の注意改訂のお知らせ

平成 26 年 9 月

劇薬、処方箋医薬品(注意－医師等の処方箋により使用すること)

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

グリメピリド錠 0.5mg 「サンド」

グリメピリド錠 1mg 「サンド」

グリメピリド錠 3mg 「サンド」

日本薬局方 グリメピリド錠

サンド株式会社
山形県上山市新金谷827-7

このたび、標記製品の使用上の注意事項を改訂(自主改訂)いたしましたので、お知らせいたします。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部____:改訂箇所)】

改訂後	改訂前																		
<p>【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用</p> <p>変更なし</p> <p>併用注意(併用に注意すること)</p> <p>(1)血糖降下作用を増強する薬剤</p> <p>1)臨床症状 変更なし</p> <p>2)措置方法 変更なし</p> <p>3)薬剤名等：作用機序</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">変更なし</td></tr><tr><td>GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>変更なし</td></tr><tr><td>SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン レープロリン トホグリフロジン水和物等</td><td>尿中へのブドウ糖排泄促進</td></tr><tr><td colspan="2">変更なし</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	変更なし		GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等	変更なし	SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン レープロリン トホグリフロジン水和物等	尿中へのブドウ糖排泄促進	変更なし		<p>【使用上の注意】</p> <p>3.相互作用</p> <p>省略</p> <p>併用注意(併用に注意すること)</p> <p>(1)血糖降下作用を増強する薬剤</p> <p>1)臨床症状 省略</p> <p>2)措置方法 省略</p> <p>3)薬剤名等：作用機序</p> <table border="1"><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>作用機序</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">省略</td></tr><tr><td>GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等</td><td>省略</td></tr><tr><td colspan="2">省略</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	作用機序	省略		GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等	省略	省略	
薬剤名等	作用機序																		
変更なし																			
GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等	変更なし																		
SGLT2阻害剤 イブラグリフロジン レープロリン トホグリフロジン水和物等	尿中へのブドウ糖排泄促進																		
変更なし																			
薬剤名等	作用機序																		
省略																			
GLP-1受容体作動薬 リラグルチド等	省略																		
省略																			

【改訂理由 自主改訂】

グリメピリド製剤の情報に基づき改訂いたしました。

- 「3.相互作用 併用注意」の項の「血糖降下作用を増強する薬剤」へ「SGLT2 阻害剤」を追記いたしました。

なお、上記改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU)No.233」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、サンドのホームページ「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)にてご覧になれます。

【資料請求先】

サンド株式会社

カスタマーケアグループ

〒106-0031 東京都港区西麻布 4-16-13

フリーコール (0120) 982-001

FAX (03) 5469-0366

受付時間 9:00~17:00

(土・日、祝日及び当社休日を除く)