

使用上の注意改訂のお知らせ

平成30年2月

劇薬、処方箋医薬品(注意－医師等の処方箋により使用すること)

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

サンド株式会社

山形県上山市新金谷827-7

セルトラリン錠 25mg「サンド」

セルトラリン錠 50mg「サンド」

セルトラリン錠 100mg「サンド」

塩酸セルトラリン錠

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部:変更箇所)】

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチルチオニウム塩化物水和物(メチレンブルー)	セロトニン症候群があらわれるおそれがある。	左記薬剤のMAO阻害作用によりセロトニン作用が増強されると考えられる。	リネゾリド	セロトニン症候群の症状(錯乱、協調運動障害、血圧上昇等)があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、本剤と併用薬の両方あるいはいずれか一方の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	リネゾリドは非選択的、可逆的MAO阻害作用を有する。
リネゾリド	セロトニン症候群の症状(錯乱、協調運動障害、血圧上昇等)があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、本剤と併用薬の両方あるいはいずれか一方の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	リネゾリドは非選択的、可逆的MAO阻害作用を有する。	省略		
変更なし					
4. 副作用 (2)その他の副作用			4. 副作用 (2)その他の副作用		
種類	頻度不明		種類	頻度不明	
変更なし			省略		
筋・骨格系	背部痛、関節痛、筋緊張異常(筋硬直、筋緊張亢進、筋痙攣等)、開口障害		筋・骨格系	背部痛、関節痛、筋緊張異常(筋硬直、筋緊張亢進、筋痙攣等)	
変更なし			省略		

【改訂理由】

塩酸セルトラリン製剤の情報に基づき改訂いたしました。

- ・「3. 相互作用(2)併用注意」「4. 副作用(2)その他の副作用」の項を一部変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU)No.267」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、弊社ホームページの「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)に掲載されます。

【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ
フリーコール (0120) 982-001 FAX(03) 6257-3633
受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日及び当社休日を除く)