

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）  
選択的セロトニン再取り込み阻害剤

2023年1月  
**サンド株式会社**  
東京都港区虎ノ門1-23-1

# セルトラリン錠 25mg「サンド」

# セルトラリン錠 50mg「サンド」

# セルトラリン錠 100mg「サンド」

セルトラリン塩酸塩錠

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部：改訂箇所)】

改訂後			改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）			<b>【使用上の注意】</b> 3. 相互作用 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし	変更なし	変更なし	省略	省略	省略
トラマドール塩酸塩含有製剤 メサドン塩酸塩 ペンタゾシン含有製剤 ペチジン塩酸塩含有製剤 タペンタドール塩酸塩 デキストロメトर्फェン 臭化水素酸塩水和物含有製剤 フェンタニル含有製剤	変更なし	変更なし	トラマドール メサドン ペンタゾシン	省略	省略
変更なし	変更なし	変更なし	省略	省略	省略
スルピリン水和物	本剤の血漿中濃度が低下し、有効性が減弱するおそれがある。	併用によりCYP2B6及びCYP3A4が誘導され、本剤の代謝が促進されるためと考えられる。	新設	新設	新設
4. 副作用 (2) その他の副作用			4. 副作用 (2) その他の副作用		
種類	頻度不明		種類	頻度不明	
変更なし	変更なし		省略	省略	
その他	倦怠感、多汗（発汗、寝汗等）、無力症、熱感、異常感、胸痛、胸部圧迫感、疲労、発熱、ほてり、悪寒、体重減少、体重増加、末梢性浮腫、あくび、脱毛症、気管支痙攣、好酸球性肺炎		その他	倦怠感、多汗（発汗、寝汗等）、無力症、熱感、異常感、胸痛、胸部圧迫感、疲労、発熱、ほてり、悪寒、体重減少、体重増加、末梢性浮腫、あくび、脱毛症、気管支痙攣	

**【改訂理由】**

セルトラリン塩酸塩製剤の情報に基づき、「3. 相互作用 (2) 併用注意」、「4. 副作用 (2) その他の副作用」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No. 314」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、弊社ホームページの「医療関係者向け情報」(<https://www.sandoz.jp/products>)に掲載されます。

**【資料請求先】**

サンド株式会社 カスタマーケアグループ  
フリーコール (0120) 982-001 FAX(03) 6257-3633  
受付時間 9:00～17:00(土・日、祝日及び当社休日を除く)