

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

平成 28 年 4 月

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

タゾピペ配合静注用 2.25 「サンド」

タゾピペ配合静注用 4.5 「サンド」

日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン

サンド株式会社
山形県上山市新金谷827-7

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

タゾピペ配合点滴静注用 2.25 バッグ「サンド」

タゾピペ配合点滴静注用 4.5 バッグ「サンド」

注射用タゾバクタム・ピペラシリン

このたび、標記製品の使用上の注意事項を改訂(自主改訂)いたしましたので、お知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部____:追記箇所)】

改訂後	改訂前
<2 製剤共通> 【使用上の注意】 8.臨床検査結果に及ぼす影響 (1)~(2)変更なし <u>(3)本剤の投与により、侵襲性アスペルギルス症の診断に用いられる血清中アスペルギルス抗原(ガラクトマンナン)の検査では、偽陽性を呈することがあるので注意すること。</u>	<2 製剤共通> 【使用上の注意】 8.臨床検査結果に及ぼす影響 (1)~(2)省略

【改訂理由 自主改訂】

- 「8.臨床検査結果に及ぼす影響」の項に血清中アスペルギルス抗原(ガラクトマンナン)の検査結果に及ぼす影響を追記し、注意喚起いたしました。

なお、改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU)No.249」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、サンドのホームページ「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)にてご覧になれます。

【資料請求先】

サンド株式会社

カスタマーケアグループ

〒105-6333 東京都港区虎ノ門 1-23-1

フリーコール (0120) 982-001

FAX (03) 6257-3633

受付時間 9:00~17:00

(土・日、祝日及び当社休日を除く)